

# 康复新液治疗糜烂型胃炎 112 例疗效分析

Clinical Analysis of "Kangfuxin Fluid" in Treating 112 Cases of Erosive Gastritis

上海中医药大学附属龙华医院内镜中心  
Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine WU He-ping LI Ping ZHENG Yu  
(上海 200032)

**摘要:** 口服中药康复新液治疗糜烂型胃炎 112 例, 隆起糜烂型胃炎疗程为 3 个月, 平坦糜烂型胃炎疗程为 2 个月, 其有效率分别为 92%、91%。康复新液有缓急止痛、化瘀生新、理气散结等作用。

**关键词:** 康复新液; 糜烂型胃炎; 隆起型; 平坦型

中图分类号: R 256.3 文献标识码: B 文章编号: 1007-1334(2004)02-0028-02

慢性糜烂型胃炎近年来的发病有增多趋势, 本院内镜中心从 2001 年 4 月 ~ 2003 年 6 月共诊治糜烂型胃炎 654 例, 我们对其中的 112 例患者采用康复新液治疗, 兹将治疗结果总结如下。

## 一、材料和方法

### 1. 诊断标准

所有纳入患者均需符合下列入选标准: ①经内镜下确诊为糜烂型胃炎; ②年龄在 20 ~ 69 岁, 性别不限; ③糜烂直径在 0.3 ~ 1.0cm 之间, 糜烂数目不限。排除标准为: ①同时伴有溃疡的糜烂型胃炎患者; ②胃大部切除术后的患者; ③有严重并发症的患者。

### 2. 临床资料

112 例在胃镜下诊断为隆起糜烂型或平坦糜烂型胃炎的门诊患者随机进入康复新液治疗组, 其中男性 78 例, 女性 34 例, 平均年龄 (45.6 ± 13.7) 岁, 隆起糜烂型胃炎 36 例, 平坦糜烂型胃炎 76 例。另随机选择 100 例作对照组, 其中男性 65 例, 女性 35

例。在内镜检查方面, 两组间也无显著性差异 ( $P > 0.05$ )。

### 3. 治疗方法

治疗组口服康复新液(四川佳能达攀西药业有限公司生产, 50ml/瓶)10ml/次, 每日 3 次; 对照组口服溃疡宁胶囊(天津市第五中药厂生产, 24 片/盒)3 粒/次, 每晚 1 次。隆起糜烂型胃炎疗程为 3 个月, 平坦糜烂型胃炎为 2 个月。

### 4. 观察项目

从临床症状来观察治疗前、治疗 1 个月、治疗 2 个月和治疗结束时患者的相关症状(包括疼痛、嗳气、泛酸、腹胀等)。在治疗结束后都进行内镜检查, 了解目前胃内情况并与治疗前进行对照, 以作出内镜评估。

### 5. 疗效判断

观察指标为糜烂愈合和临床症状缓解, 其中以内镜评估作为主要观察指标。评定标准按照卫生部“疾病治疗效果评定标准”(1981 年拟定)。痊愈: 糜烂及周围炎症全部消失, 显效: 糜烂消失, 但仍有

